


L'infarctus du myocarde a-t-il un genre ?

Lecture sociologique d'un paradoxe épidémiologique

Nathalie Bajos, Collège de France

MCV : 1^{ère} cause de mortalité dans le monde

(20 millions en 2021, 80% dans les pays de faible ou moyens revenus
2^{ème} cause de mortalité pour les femmes en France



Regional trends in age-standardised cardiovascular disease death rate (per 100,000 people), 1990–2019.

Les hommes sont plus touchés ...mais les femmes en meurent plus ...

Mortalité à long terme
(>5 ans) après un infarctus





Figure 5. Multivariate-adjusted risk ratios (RRs) for studies stratified by length of follow-up.

Comment expliquer ce paradoxe ?

- Les femmes s'alertent moins en cas de symptômes évocateurs
- Elles tardent à accéder au système de soins
- Elles ressentent les symptômes et s'expriment différemment des hommes et ne passent écoutées de la même manière par les professionnel·les de santé
- Elles reçoivent des traitements diagnostics et thérapeutiques moins favorables

Pour une approche intersectionnelle au
risque de l'essentialisation

L'espace social du ressenti des symptômes







Figure 2. Pooled crude and adjusted odds ratios of symptoms experienced by women relative to men. OR indicates odds ratio.

La prise en charge par les professionnels de
santé

Assessment of priority according to gender



Assessment of priority according to gender and ethnic appearance




Table 3 Multivariate analysis of factors associated with the classification of a clinical case as a life-threatening emergency


	OR (95% CI)	<i>P</i> value
Medical profession	1.72 (1.39; 2.13)	<0.01
Clinical experience in emergency medicine	1.04 (1.03; 1.06)	<0.01
Black male appearance	0.58 (0.38; 0.90)	0.01
North African male appearance	1.32 (0.85; 2.04)	0.21
Asian male appearance	0.93 (0.60; 1.44)	0.75
White female appearance	0.63 (0.41; 0.96)	0.03
Black female appearance	0.38 (0.25; 0.57)	<0.01
North African female appearance	0.59 (0.39; 0.89)	0.01
Asian female appearance	0.53 (0.35; 0.81)	<0.01

For profession reference was nurse. For patient appearance reference was White male.

CI, confidence interval; OR, odds ratio.

Les suites de la prise en charge

Proportion de patient·es admis·es en soins de suite et de réadaptation après un infarctus du myocarde



Gabet et al, Arch Cardiovasc Dis, 2017

Pour une réduction des inégalités

- Former les professionnel·les
- Modifier les recommandations des sociétés savantes
- Campagnes d'information
- Poursuivre les recherches dans une perspective intersectionnelle